

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
№ 12 від 03.01.2018  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/0597/01/01  
**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
№ 1309 від 13.07.2018

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ФОРМІДРОН**

**Склад:**

*діючі речовини:* формальдегід, етанол;

100 мл розчину містять розчину формальдегіду в перерахуванні на 35 % вміст формальдегіду - 10,0 г, етанолу 96 % - 39,5 г;

*допоміжні речовини:* одеколон, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні препарати. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі.

Код АТХ D11A A.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат чинить дезінфікуючу та дезодоруючу дію.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пігментності.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Захворювання шкіри. Дитячий вік до 14 років.

**Особливі заходи безпеки.**

З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не описана.

**Особливості застосування.**

Різке почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного припинення застосування препарату.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Застосовують зовнішньо. Дорослим і дітям старше 14 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1-2 рази на добу.

*Діти.*

Не застосовується у дітей віком до 14 років.

***Передозування.***

Не слід допускати передозування препарату. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербіжжю, подразнення, що є ознаками передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.

***Побічні реакції.***

Подразнення шкіри, алергічні реакції, відчуття свербіжжю.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

***Термін придатності.*** 4 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 50 мл у флаконах, по 100 мл у флаконах в пачці або без пачки.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Заявник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження заявника.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Дата останнього перегляду.*** 13.07.2018 р.