

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**13.05.2017 № 516**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/15963/0101**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**СЕПТАВІОЛ 70 %**  
**(Septaviol 70 %)**

**Склад:**

*діюча речовина:* етанол;  
не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу та вода.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфекційні засоби.  
**Код АТХ D08A X08.**

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.* При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для оттирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

**Особливі заходи безпеки.**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо - для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.

Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.

***Діти.*** Застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.*** При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

***Побічні реакції.*** При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.*** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Бергти від вогню.

***Упаковка.*** По 100 мл у флаконах скляних або полімерних

***Категорія відпуску.*** За рецептом.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола»

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Дата останнього перегляду.*** 13.05.2017 р.