

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**№ 1345 від 15.12.2016**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/6546/01/01**

**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**№ 1495 від 29.11.2017**

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**СПИРТ МУРАШИНИЙ**

**Склад:**

*діюча речовина:* кислота мурашина;  
100 мл препарату містять кислоти мурашиної 1,4 г;  
*допоміжна речовина:* етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна рідина із специфічним різким запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.  
Код АТХ M02A X10.

**Фармакологічні властивості.**

Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Невралгії, міозити, артралгії.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

**Особливі заходи безпеки.**

Запобігати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

***Особливості застосування.***

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Спирт мурашиний застосовувати зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

***Діти.***

Не застосовують дітям віком до 12 років.

***Передозування.***

Не спостерігалось.

***Побічні реакції.***

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

***Термін придатності. 3 роки.***

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

***Умови зберігання.*** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** По 40 мл або 50 мл у флаконах.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Заявник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження заявника.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

***Дата останнього перегляду.*** 29.11.2017 р.